

DESCRIPTION

D'UN

NOUVEAU "CHLAMYS,, DU CONGO BELGE

PAR

J. ACHARD

Chlamys Schoutedeni n. sp.

Forme large et trapue, légèrement atténuée postérieurement. En entier d'un fauve clair avec une petite macule brune sur le front, la déclivité postérieure de la bosse prothoracique et les parties enfoncées du pronotum et des élytres d'un brun foncé; parfois avec les élytres entièrement bruns.

Tête plane, rugueusement ponctuée; épistome légèrement concave à son bord antérieur; labre transverse, assez grand; yeux grands, très fortement échancrés.

Prothorax transverse avec les angles antérieurs fortement surbaissés, base bisinuée de chaque côté, bords latéraux rectilignes, avec les angles antérieurs aigus et les angles postérieurs légèrement obtus. Surface fortement ponctuée, rugueuse par places, notamment sur la déclivité postérieure de la bosse médiane. Celle-ci assez élevée, abrupte en arrière et s'abaissant en avant en ligne convexe. Sillon médian large, divisant le sommet de la bosse en deux crêtes légèrement divergentes, précédées chacune d'un petit tubercule placé au début de la déclivité antérieure. Déclivités latérales irrégulièrement bosselées.

Écusson grand, caréné longitudinalement en son milieu; angles postérieurs fortement prolongés en pointes divergentes relevées en lames tranchantes.

Élytres rétrécis après l'épaule, puis légèrement atténués jusqu'au sommet;